

公示稿

紫檀香

ཅན་དན་དམར་ཤི།

Zitanxiang

赞旦玛布

PTEROCARPI INDICI LIGNUM

本品系藏族习用药材。为豆科植物紫檀 *Pterocarpus indicus* Willd. 的干燥心材。采伐后，除去外皮和边材，锯成小段，晾干。

【性状】本品呈长圆柱形，长约 100cm，直径 7~15cm，或片块状，大小不等，多数具有人工雕刻的类圆形孔。外表面红棕色、暗棕色，有的带绿色光泽，鲜品为鲜红色；横断面可见细小孔点，纵向劈开面纹理顺直。质致密而重，不易折断。气微香，味淡。

【鉴别】(1) 本品横切面：导管常单个散在，胞壁厚，单纹孔或重纹孔，内含红色树脂状物。木细胞常 4~5 列，壁略增厚而生孔裂。射线细胞为 1~2 列，壁微厚而生孔裂，内亦含红色树脂状物。

(2) 取本品【含量测定】项下挥发油 0.4ml，加乙醚 5ml 使溶解，作为供试品溶液。另取紫檀香挥发油对照提取物同法制备，作为对照提取物溶液。照薄层色谱法(中国药典 2015 年版通则 0502)试验，吸取上述两种溶液各 2 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以石油醚(60~90℃)-乙酸乙酯(17: 3)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以对二甲氨基苯甲醛溶液(取对二甲氨基苯甲醛 0.25g，溶于冰醋酸 50ml 中，加 85%磷酸 3ml 与水 20ml，混匀)，在 80~90℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【含量测定】照挥发油测定法(中国药典 2015 年版通则 2204)测定。

本品含挥发油不得少于 0.50%(ml/g)。

【炮制】劈开，粉碎，或煎膏。

【性味】凉，涩。

【功能与主治】清血热，消气血不和。用于热血入分，恶血瘀阴、风血交杂症。外涂消肢节肿胀。

【用法与用量】0.5~1g；外用适量。

【贮藏】置通风干燥处