

公示稿

紫草茸

Zicaorong

LACCA

本品系藏族习用药材。为胶蚧科动物紫胶虫 *Laccifer lacca* Kerr. 的雌体寄生于豆科檀属 *Dalbergia* L. f. 和梧桐科火绳树属 *Eriolaena* DC. 等为主的多种植物的树干上，所分泌的胶质物。7~8月将成熟的紫胶连枝剪下，取胶去枝，置干燥，阴凉通风处，至干燥不结块。

【性状】 本品呈不规则的半圆柱状，长1~7cm，宽1~1.5cm。表面红黄色或紫褐色，凹凸不平，有皱纹、小虫眼及孔隙，与树枝相接面处凹入成沟状，边缘钝圆。质硬而脆，断面可见放射状排列的长圆形虫窝，其内常见白色粉末或紫黑色虫之尸体。气微，味微涩。

【鉴别】 (1) 本品遇热即软化溶解，并放出大量气泡而体积膨胀；燃烧时产生黑烟和特臭。

(2) 取本品粉末 0.5g，加乙酸乙酯 20ml，超声处理 10 分钟，滤过，滤液浓缩至 1ml，作为供试品溶液。另取紫草茸对照药材 0.5g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(中国药典 2015 年版通则 0502)试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以石油醚(60~90℃)-乙酸乙酯(17:3)为展开剂，展开，取出，晾干。在紫外光(365nm)下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。再喷以 5%硫酸乙醇溶液，在紫外光(365nm)下检视，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 杂质 不得过 5%(中国药典 2015 年版通则 2301)。

总灰分 不得过 8.0%(中国药典 2015 年版通则 2302)。

酸不溶性灰分 不得过 2.5%(中国药典 2015 年版通则 2302)。

【炮制】 除去杂质。

【性味】 甘、咸，平。

【功能与主治】 消毒，止血，活血化瘀。用于血痹热，肿毒恶疮，瘀血不化。

【用法与用量】 1.5~6g。

【贮藏】 置通风干燥处。