炎宁糖浆

Yinning Tangjiang

【处方】鹿茸草 1562.5g　　白花蛇舌草 781.25g　　鸭跖草 781.25g

【制法】以上三味，加水煎煮二次，第一次 1.5 小时，第二次 1 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至相对密度为 1.10（85～95℃）的清膏，加乙醇使含醇量达 60 %，搅匀，静置 12 小时，滤过，滤液回收乙醇，浓缩至相对密度为 1.10～1.30（75℃）的清膏；另取蔗糖 650g，制成单糖浆，加至上述浓缩液中，混匀，浓缩至 1000 ml，加入 0.15 %山梨酸钾，混匀，即得。

【性状】本品为红棕色至深棕色的黏稠液体；气香，味微甜、苦。

【鉴别】（1）取本品 10 ml，加硅藻土适量拌匀，干燥，加乙醇 30 ml，静置 12 小时，滤过，滤液浓缩至约 2 ml，作为供试品溶液。另取白花蛇舌草对照药材 1 g，加水 30 ml，加热回流 1 小时，放冷，滤过，滤液浓缩至约 15 ml，加乙醇 30 ml，静置 12 小时，滤过，滤液浓缩至约 2 ml，作为对照药材溶液。照薄层色谱法（通则 0502）试验，吸取供试品溶液 10 μl、对照药材溶液 5 μl，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-水（5：1.5：0.1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10 %硫酸乙醇溶液，在 105 ℃加热至斑点显色清晰，在日光下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

（2）取本品 5 ml，加水 20 ml,摇匀，用乙酸乙酯振摇提取 4 次，每次 25 ml，合并乙酸乙酯液，回收溶剂至干，残渣加甲醇 2 ml 使溶解，作为供试品溶液。另取咖啡酸对照品,加甲醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 2 μl，分别点于同一聚酰胺薄膜上，以醋酸为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365 nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】相对密度　应不低于 1.18（通则 0601）。

pH 值　应为 4.0～5.5（通则 0631）。

其他　应符合糖浆剂项下有关的各项规定（通则 0116）。

【含量测定】照高效液相色谱法（通则 0512）测定。

色谱条件及系统适用性试验　以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-水（4：96）为流动相；检测波长为 237 nm。理论板数按去乙酰车叶草酸甲酯峰计算应不低于 4000。

对照品溶液的制备　取去乙酰车叶草酸甲酯对照品适量，精密称定，加 4 % 乙腈制成每 1 ml 含 40 μg 的溶液，即得。

供试品溶液的制备　取本品 5g，精密称定，置 25ml 量瓶中，加水使溶解并稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法　分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 5 μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每 1 g 含白花蛇舌草以去乙酰车叶草酸甲酯($C_{17}H_{24}O_{11}$)计，不得少于 80μg。

【功能与主治】　清热解毒，消炎止痢。用于上呼吸道感染，扁桃体炎，尿路感染，急性菌痢，肠炎。

【用法与用量】　口服。一次 10 ml，一日 3～4 次；儿童酌减。

【规格】　（1）每瓶装 3 ml　（2）每瓶装 60 ml　（3）每瓶装 100 ml

【贮藏】　遮光，密封。

公示稿