

公示稿

梔子

Zhizi

GARDENIAE FRUCTUS

【检查】 水分 不得过 8.5%(通则 0832 第二法)。

总灰分 不得过 6.0%(通则 2302)。

重金属及有害元素 照铅、镉、砷、汞、铜测定法（通则 2321 原子吸收分光光度法或电感耦合等离子体质谱法）测定，铅不得过 5mg/kg；镉不得过 1mg/kg；砷不得过 2mg/kg；汞不得过 0.2mg/kg；铜不得过 20mg/kg。

饮片

【炮制】 梔子 除去杂质，碾碎。

【性状】 本品呈不规则的碎块。果皮表面红黄色或棕红色，有的可见翅状纵横。种子多数，扁卵圆形，深红色或红黄色。气微，味微酸而苦。

【鉴别】 **【检查】** **【含量测定】** 同药材。

炒梔子 取净梔子，照清炒法（通则 0213）炒至黄褐色。

【性状】 本品形如梔子碎块，黄褐色。

【含量测定】 同药材，药材含梔子苷（ $C_{17}H_{24}O_{10}$ ）不得少于 1.5%。

【鉴别】 **【检查】**（水分、总灰分） 同药材。

【性味与归经】 苦，寒。归心、肺、三焦经。

【功能与主治】 泻火除烦，清热利湿，凉血解毒；外用消肿止痛。用于热病心烦，湿热黄疸，淋证涩痛，血热吐衄，目赤肿痛，火毒疮疡；外治扭挫伤痛。

【用法与用量】 6~10 g。外用生品适量，研末调敷。

【贮藏】 置通风干燥处。