

盐车前子（车前）配方颗粒

Yancheqianzi (Cheqian) Peifangkeli

【来源】 本品为车前科植物车前 *Plantago asiatica* L. 的干燥成熟种子经炮制并按标汤的主要质量指标加工而成的配方颗粒。

【制法】 取盐车前子饮片 5000g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为 8.5%~14.0%），加辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加辅料适量，混匀，制粒，制成 1000g，即得。

【性状】 本品为灰黄色至棕黄色的颗粒；气微，味淡微咸。

【鉴别】 取本品 0.5g，研细，加甲醇 20ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取车前子（车前）对照药材 1g，加水 50ml，煎煮 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 20ml，同法制成对照药材溶液。再取京尼平苷酸对照品，加甲醇分别制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2015 年版 通则 0502）试验，吸取上述三种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 GF₂₅₄ 薄层板上，以乙酸乙酯-甲醇-甲酸-水(18:2:1.5:1)为展开剂，展开，取出，晾干，在紫外光(254nm)下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【特征图谱】 照高效液相色谱法（中国药典 2015 年版 通则 0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为 100mm，内径为 2.1mm，粒径为 2.2 μ m）；以甲醇为流动相 A，以 0.3% 醋酸溶液为流动相 B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟 0.3ml；柱温为 30 $^{\circ}$ C；检测波长为 245nm。理论板数按京尼平苷酸峰计算应不低于 3000。


时间（分钟）	流动相 A（%）	流动相 B（%）
0~0.2	5	95
0.2~8	5→60	95→40
8~10	60→5	40→95
10~15	5	95

参照物溶液的制备 取车前子（车前）对照药材0.4g，置具塞锥形瓶中，加入60%甲醇50ml，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取京尼平苷酸对照品适量，精密称定，置棕色量瓶中，加60%甲醇制成每1ml含0.1mg的溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备 取本品适量，研细，取约0.2g，精密称定，同“对照药材参照物溶液”制备方法制备供试品溶液。

测定法 分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各2 μ l，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱图中应呈现4个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的4个特征峰相对应，其中峰2保留时间应与京尼平苷酸对照品参照物峰保留时间相对应。与京尼平苷酸参照物相应的峰为S峰，计算各特征峰与S峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的 $\pm 10\%$ 之内。规定值为：0.18（峰1）、1.88（峰3）、2.03（峰4）。在相对保留时间为 $1.61 \pm 5\%$ 处不得检出色谱峰。



对照特征图谱

峰1：车前糖 峰2（S）：京尼平苷酸 峰3：毛蕊花糖苷 峰4：异毛蕊花糖苷

色谱柱 Acclaim C18，2.1mm \times 100mm，2.2 μ m

【检查】 应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2015年版 通则0104）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（中国药典2015年版 通则2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于11.0%。

【含量测定】 照高效液相色谱法（中国药典2015年版 通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径为2.2 μ m）；以甲醇为流动相A，以0.5%醋酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；检测波长为245nm。理论板数按京尼平苷酸峰计算应不低于3000。

时间（分钟）	流动相A（%）	流动相B（%）
0→0.2	5	95
0.2→10	5→60	95→40
10→10.1	60→5	40→95
10.1→15	5	95

对照品溶液的制备 取京尼平苷酸对照品、毛蕊花糖苷对照品适量，精密称定，置棕色量瓶中，加60%甲醇制成每1ml分别含150 μ g、15 μ g的混合溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品适量，研细，取约0.3g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入60%甲醇50ml，密塞，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用60%甲醇补足减失的重量，摇匀、滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各2 μ l，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含京尼平苷酸（ $C_{16}H_{22}O_{10}$ ）应为11.0mg~35.0mg，含毛蕊花糖苷（ $C_{29}H_{36}O_{15}$ ）应为1.30mg~8.0mg。

【规格】 每1g配方颗粒相当于饮片5g。

【贮藏】 密封。